

## Οδηγίες Φύτευσης

**Όλες οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την διαδικασία αποτελούν έναν οδηγό βοήθειας και μόνο. Τροποποιήσεις μπορούν να υπάρξουν λόγω διαφοροποίησης των συνθηκών.**

✿ Η φύτευση θα πρέπει να γίνεται σε αγρό στον οποίο έχει πραγματοποιηθεί με επιμέλεια η προετοιμασία του που περιλαμβάνει τη σε βάθος κατεργασία (0,8-1μ), την εξυγίανση του αν πρόκειται για αναφύτευση του ίδιου αμπελοτεμαχίου και τη βασική ανόργανη και οργανική του λίπανση.

✿ Τα γυμνόριζα εμβολιασμένα μοσχεύματα αμπέλου πρέπει να φυτεύονται, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, αργά το χειμώνα μέχρι και την άνοιξη. Το έδαφος πρέπει να βρίσκεται στην κατάλληλη υγρασιακή κατάσταση.

✿ Τα φυτώρια παραγωγής μας είναι επιλεγμένα, ελεγμένα, πακεταρισμένα μέσα σε χάρτινα κιβώτια τυλιγμένα με πλαστικό, σε δέματα των 25 φυτωρίων και τοποθετημένα για αποθήκευση στους 2°C μέχρι τον χρόνο παράδοσης στους αμπελουργούς. Από την στιγμή που εκτελείται η παραγγελία και τα φυτώρια βγαίνουν από το ψυγείο, πρέπει να φυτευτούν το συντομότερο δυνατό και είναι προτιμότερο να μην ξαναμπούν στο ψυγείο. Προτείνουμε την τοποθέτηση των φυτών στο νερό για μία μέρα πριν την φύτευση ώστε να ενυδατωθούν πλήρως.

✿ Για την φύτευση ανοίξτε λάκους βάθους 40-50 εκ και διάμετρο 30-35 εκ και κουρέψτε τις ρίζες των φυτωρίων σε μήκος περίπου 12-15 εκ.

✿ Τοποθετήστε το φυτό στο πάτο του λάκου, απλώστε καλά τις ρίζες και σκεπάστε το φυτό με ψιλοτριμμένο καλής ποιότητας και καθαρό από ζιζανιοκτόνα χώμα κατά 15-20 εκ. Πατήστε ελαφρά το χώμα μέσα στον λάκο ώστε αυτό να

έρθει σε καλή επαφή με το ριζικό σύστημα του φυτού και συνεχίστε το γέμισμα του λάκου. Ξαναπατατήστε ελαφρά για να αποφύγετε την δημιουργία κενών. Το σημείο του εμβολιασμού πρέπει να βρίσκεται 3 – 5 εκατοστά πάνω από την επιφάνεια του εδάφους.

✿ Το συντομότερο δυνατό μετά την φύτευση, ποτίστε ώστε να κρατηθεί υγρό το έδαφος γύρω από τις ρίζες και να σταθεροποιηθεί το χώμα γύρω από το φυτό.

✿ Η φύτευση των φυτωρίων είναι μία πολύ κρίσιμη διαδικασία για την επιβίωση τους. Το εκτεθημένο εκτός του εδάφους μέρος του φυτού χάνει νερό και αν οι ρίζες δεν μπορούν να το αναπληρώσουν επέρχεται αφυδάτωση και ξήρανση αυτού. Για να μειωθεί η ένταση της αφυδάτωσης πριν τη δημιουργία του νέου ριζικού συστήματος, προτείνουμε να σκεπάσετε με ψιλοτριμμένο χώμα ολόκληρο το φυτό πάνω από την επιφάνεια του εδάφους. Αυτή η πρακτική είναι εξαιρετικά σημαντική για τις καθυστερημένες φυτεύσεις οπότε και επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες καθώς επίσης και για την προστασία των νεοεκπυσόμενων ματιών σε περιοχές που συμβαίνουν όψιμοι παγετοί.

✿ Μην ποτίζετε αν δεν ελαττωθεί η υγρασία στο βάθος της ρίζας. Το πότισμα πρέπει να αναπληρώνει το νερό στο έδαφος μέχρι βάθους περίπου 15 εκ κάτω από το ριζόστρωμα. Μην υπερβάλετε στη δόση και τη συχνότητα των αρδεύσεων.

